

BANCO NACIONAL DE LÍNEAS CELULARES (TRONCALES)
National Bank of Stem Cell Lines
IMPRESO DE SOLICITUD DE DEPÓSITO DE UNA LÍNEA
Application Form to Deposit a Human Cell Line

Documentos que se acompañan:

Attached documents:

- Copia de la autorización de derivación de la línea celular, junto con informe del Comité Ético del centro de procedencia.
A copy of the authorization for the derivation of the cell line, with the corresponding ethics committee approval
- Copia de cualquier publicación científica relacionada con la derivación y/o caracterización de la línea.
A copy of any relevant published scientific papers related to the derivation and/or characterization of the cell line
- C. V. del investigador principal (una página; formato libre).
A one page CV for the Principal Investigator
- Otros (especificar).
Others (specify)

SECCIÓN 1

Section 1

Información General
General Information

Nombre de la línea: [K]iPS4F-1

Name of the line:

Investigador principal: Juan Carlos Izpisúa Belmonte, Trond Aasen, Alessandra Giorgetti
Principal Investigator:

Origen de la línea celular:

Origin of the cell line

Embrionario **Fetal** **Adulto**
Embryonic *Fetal* *Adult*

¿La línea celular ha sido derivada de un embrión con anomalía genética?
Has the cell line been derived from an embryo with genetic anomaly?

NO **SÍ** (especificar)
No *Yes* *(specify)*

Identificación genética de la línea celular. Método y resultado

Genetic identity of the cell line. Method and result

SECCIÓN 2

Section 2

Datos del Depositante

Applicant Details

| | |
|---|---|
| Investigador Principal: <i>Principal Investigator:</i> Juan Carlos Izpisúa Belmonte Trond Aasen, Alessandra Giorgetti | Dirección Postal: <i>Postal address:</i> Dr. Aiguader 88. 08003 Barcelona |
| Centro de Trabajo: <i>Institution:</i> Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona | Teléfono (phone): 93 3160300 Fax: 93 3160301 E-mail: blc@cmrb.eu |

SECCIÓN 3

Section 3

Datos de la Línea Celular

Details of Cell Line

| | |
|--|--|
| Tipo de muestra biológica (especificar estadio embrionario, semanas de gestación,...) <i>Kind of biological sample (specify embryonic stage, weeks of pregnancy,...)</i> | |
| Queratinocitos de prepucio <i>Foreskin keratinocytes</i> | |
| Muestra biológica <i>Biological sample</i> | Fresco <input checked="" type="checkbox"/> <i>Fresh</i> |
| | Crioconservado <input type="checkbox"/> <i>Cryopreserved</i> |
| Fecha de la obtención del muestra biológica <i>Date of obtaining the biological sample</i> 18.02.2008 | Fecha del uso o descongelación (si congelado) <i>Date used or thawed (if frozen)</i> 19.02.2008 |
| Fecha de la donación del muestra biológica <i>Date of donation of the biological sample</i> 18.02.2008 | |

Descripción general del procesamiento previo del muestra biológica utilizado (cultivo embrionario, procesamiento muestra fetal o de tejido adulto)

General description of the processing of the biological sample used (embryonic culture, processing of fetal sample or of adult tissue)

Se recoge la biopsia en medio para queratinocitos libre de suero y bajo en calcio (Epilife, Invitrogen) que contiene tres tipos de antibióticos (100U/mL pen-strept. y 10 mg/mL amf.). Se coloca la biopsia en una placa (10 mm), se corta en varios trozos y se incuba 12-18h a 4°C en dispasa diluida en medio de queratinocitos para separar la dermis de la epidermis. Se separa la epidermis de la dermis con la ayuda de unas pinzas. Se incuba 1º min a 37°C en tripsina al 25%. Se añade medio de queratinocitos fresco y se lava a 1200 rpm 5 min. Se resuspende el pellet y se cultiva en medio Epilife en placas cubiertas con colágeno tipo I.

The biopsy is collected in keratinocyte serum-free low calcium medium (Epilife, Invitrogen) containing three types of antibiotics (100U/mL penicillin-streptomycin and 10 mg/mL amphotericin). The biopsy is then placed in a 10 mm dish, cut in several small pieces, and incubated for 12-18 hours at 4°C in dispase diluted in keratinocyte medium to separate the dermis from epidermis. The epidermis is separated from dermis using a pair of forceps, is incubated for 10 minutes at 37°C in trypsin (0.25%) in a 15 mL tube. Fresh keratynocyte medium is added and centrifugate for 5 min at 1200 RPM. The pellet of cells is resuspended and cultured in Epilife medium on dish coated with type I collagen.

En caso de muestra embrionaria, indicar si se utilizaron blastómeros o células de la masa celular interna y el método de aislamiento utilizado

If of embryonic origin, indicate whether blastomeres or internal cell mass were used, as well as the isolation method

Origen del soporte celular o acelular utilizado para la derivación, así como de los componentes de los medios de cultivo (si se describen en publicación, indicar además referencia)

Origin of the cellular or cellular free support used in derivation in addition to the components of the culture media (if they are described in a publication, please indicate the reference).

Support: human foreskin fibroblasts (ATCC, American Type Culture Collection, CCD1112Sk).
Culture medium: Knockout Dulbecco's modified Eagle's medium supplemented with 2 mmol/l GlutaMAX (Gibco, InVitrogen corporation), 0,05mmol/l 2-mercaptoethanol (Gibco, InVitrogen corporation), 8 ng/ml basic fibroblast growth factor (bFGF) (Invitrogen), 1% non-essential amino acids (Cambrex), 20% Knockout Serum Replacement (InVitrogen) y 0,5% Penicillin-Streptomycin (Gibco, InVitrogen corporation).

Mantenimiento de la línea: Line maintenance

Ratio de pase: Passage ratio 1:2-1:3 cada 6/7 días; 1:2-1:3 every 6/7 days

Método de pase: Passage method: mecánico/mecanichal

| Xenobióticos <i>Xenobiotics</i> | <u>si</u> <u>Yes</u> | <u>no</u> <u>No</u> |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|

**Descripción de las características morfológicas de la línea en cultivo
(forma y tamaño colonias; forma y tamaño células; ratio núcleo/citoplasma; otros)**

Description of the morphological characteristics of the line in culture (form and size of the colonies; form and size of the cells; nucleus/cytoplasm ratio; others)

Colonias grandes poligonales, ligeramente aplanadas, de un tamaño entre 1- 3 mm de diámetro de diversas formas con bordes lisos. Células de tamaño uniforme y una elevada relación núcleo/citoplasma.

Large and flat polygonal colonies, with uniformly sized cells of 1-3 mm of diameter. They have several forms and smooth edges. High nucleus/cytoplasm ratio.

Controles microbiológicos realizados (indicar detalladamente)

Microbiological controls carried out (indicate in detail)

Mycoplasma (negativo)
Mycoplasma (negative)

Marcadores:

Markers

| Método | nº pase | resultado (ARN/proteínas) Method (RNA/proteins) | comentarios | | |
|----------------|---------|--|-------------|---------|-------------|
| | | | Passage n. | results | comments |
| Oct 4 | | inmunofluorescencia | 6 | + | ver Anexo 1 |
| Nanog | | inmunofluorescencia | 6 | + | |
| Rex 1 | | - | | | |
| Sox 2 | | inmunofluorescencia | 6 | + | |
| SSEA3 | | inmunofluorescencia | 6 | + | |
| SSEA4 | | inmunofluorescencia | 6 | + | |
| TRA-1-60 | | inmunofluorescencia | 6 | + | |
| TRA-1-81 | | inmunofluorescencia | 6 | + | |
| Telomerasa | | | | | |
| Fosfatasa Alk. | | Actividad | 8 | + | ver Anexo 1 |
| Cariotipo | | | 7 | | ver Anexo 2 |
| Otros | | | | | |

Capacidad de diferenciación (ver Anexo 3)

Differentiation capacity

| | Ectodermo/ Ectoderm | | | Endodermo/ Endoderm | | | Mesodermo/ Mesoderm | | |
|----------|---------------------|---------|-----------|---------------------|---------|-----------|---------------------|---------|-----------|
| | marcador | pase | resultado | marcador | pase | resultado | marcador | pase | resultado |
| In Vitro | marker | passage | result | marker | passage | result | marker | passage | result |
| In vitro | Tuj1 | 7 | + | α-feto proteína | 7 | + | α-actinina | 7 | + |

In vivo/ in vivo (ver Anexo 4) **Método:** formación de teratomas en ratones SCID **Resultado:** +
Method: teratoma formation in SCID mice **Result:** +

Descripción de las características de diferenciación *in vitro*

Description of the differentiation characteristics in vitro

Mesodermo: cultivo de cuerpos embrioides (EBs) en medio de cultivo suplementado con ácido ascórbico. Endodermo: cultivo de cuerpos embrioides en medio de cultivo. Ectodermo: cultivo de cuerpos embrioides en medio N2/B27 suplementado con ácido retinoico.

Mesoderm: Embryoids bodies (EBs) cultured in culture medium supplemented with ascorbic acid. Endoderm: EBs culture in culture medium. Ectoderm: EBs culture in N2/B27 supplemented with retinoic acid.

Datos de la determinación de pluripotencialidad *in vivo* o formación de teratomas

Data of the pluripotentiality determination in vivo or teratoma formation

Se realizaron tinciones histológicas estándar con hematoxilina/eosina y a continuación fueron identificados tejidos procedentes de las tres capas germinales por un histopatólogo. También se realizaron pruebas de inmunohistoquímica para evidenciar la presencia de los mismos marcadores que en la diferenciación *in vitro*.

Standard histological staining was done with hematoxilin/eosin and tissues derived from all three germ layer were identified by a hystopathologist. Immunohistochemistry staining also was performed to show the presence of the same markers than in vitro differentiation.

Datos de la tipificación HLA

HLA typification data

Consistencia celular tras 6 pasos de congelación y descongelación. Resultados.

Cell consistency after 6 passages of freezing and thawing. Results.

Se observa consistencia celular tras 6 pasos de congelación y descongelación con crecimiento adecuado y características de indiferenciación.

Cellular consistency after 6 procedures of freezing and thawing, with adequate growth and undifferentiation characteristics.

Pase en el momento del registro: p 38

Passage at the time of the recording

¿Ha sido la línea modificada genéticamente?
Has the line been genetically modified?

Sí Yes

No No

¿Se llevó a cabo un análisis clonal?
Has a clonal analysis been carried out?

Sí/ Yes No **Resultado / Result**

Comentarios/ Comments:

Otras observaciones o información relevantes (a juicio del Investigador Principal):

Other observations or relevant information (to the discretion of the Principal Investigator):

Se ha producido esta línea de iPS usando una infección retroviral para introducir en las células los siguientes factores de transcripción: Oct-4, Sox2, Klf-4 y c-Myc

We have produced this iPS cell line using a retroviral infection to deliver in to the cells the selected four transcription factors: Oct-4, Sox2, Klf-4 and c-Myc

El DNA genómico de 10.000-25.000 células fué mutagenizado mediante la exposición durante 5h a una mezcla de bisulfito de sodio al 40.5% y hydroquinone 10mM (Epitect bisulfite kit). Las secuencias de interés de los promotores de Oct4 y Nanog fueron amplificadas mediante dos PCRs consecutivas. Los productos amplificados resultantes fueron clonados en los plásmidos PCR 2.1 o pGEM Easy, amplificados en células TOP10, purificados y secuenciados. La línea celular presenta una metilación casi completa de ambos promotores (ver Anexo 5)

Genomic DNA of 10,000–25,000 cells was mutagenized by exposure for 5 h to a mixture of 40.5% sodium bisulfite and 10 mM hydroquinone (Epitect bisulfite kit). The promoter sequences of interest for Oct4 and Nanog were amplified by two subsequent PCRs. The resulting amplified products were cloned into PCR 2.1 or pGEM Easy plasmids, amplified in TOP10 cells, purified and sequenced. The cell line presented near complete demethylation of both promoters (see Annex 5).

Otras observaciones o información relevantes (a llenar por el BNLC):

Other comments or relevant information (to be completed by BNLC)

Seguimiento de la línea (a llenar por el BNLC):


Follow up of the line (to be completed by BNLC)

SECCIÓN 4

Declaración

Confirmo que la información contenida en estos impresos es cierta y asumo total responsabilidad sobre la misma.

I confirm that the information contained in this form is true and I assume total responsibility for it.

| | |
|--|---|
| Firma en Representación del Centro / Signature in Representation of the Centre <i>(Representante legal del Departamento/Centro)</i> <i>(Legal Representative of the Department/Centre)</i>  Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona Dr. Aiguader, 88 08003 BARCELONA NIF G 63687222 Fecha/ Date: 17/04/2009 | Firma del Investigador Principal <i>Signature of the Principal Investigator</i>  Alonso Gómez Fecha /Date 17/04/2009 C-17 |
| Nombre y Cargo de la Persona Representante del Centro: <i>Name and Position of the Person Representing the Centre:</i> Miguel Gómez Clares. Presidente de la Junta de Gobierno | |
| Dirección Postal: <i>Postal Address:</i> Dr. Aiguader, 88. 08003. Barcelona | Teléfono /Telephone: +34 93 316 03 00 Fax: +34 93 316 03 01 E-mail: com@cmrb.eu |

ANEXOS A LA SOLICITUD DE DEPÓSITO DE LA LÍNEA CELULAR [K]iPS4F-1 EN EL BANCO NACIONAL DE LÍNEAS CELULARES.

SOLICITUD DE DEPÓSITO DE LA LÍNEA CELULAR [K]iPS4F-1 EN EL BANCO NACIONAL DE LÍNEAS CELULARES

ANEXOS

Anexo 1: Marcadores de indiferenciación [K]iPS4F-1

Anexo 2: Cariotipo [K]iPS4F-1


Anexo 3: Diferenciación *in vitro* [K]iPS4F-1

Anexo 4: Diferenciación *in vivo* [K]iPS4F-1


Anexo 5: Estudio de la metilación de los promotores Oct4 y Nanog en [K]iPS4F-1

Anexo 1


Marcadores de indiferenciación [K]iPS4F-1



Actividad **fosfatasa alcalina** de la línea de células madre pluripotentes [K]iPS4F-1




Inmunodetección de la línea de células madre pluripotentes [K]iPS4F-1 para Oct4 y SSEA-3




Inmunodetección de la línea de células madre pluripotentes [K]iPS4F-1 para SSEA4

SOLICITUD DE DEPÓSITO DE LA LÍNEA CELULAR [K]iPS4F-1 EN EL BANCO NACIONAL DE LÍNEAS CELULARES



Inmunodetección de la línea de células madre pluripotentes [K]iPS4F-1 para Nanog y TRA-1-60



Inmunodetección de la línea de células madre pluripotentes [K]iPS4F-1 para Sox2 y TRA-1-80

SOLICITUD DE DEPÓSITO DE LA LÍNEA CELULAR [K]iPS4F-1 EN EL BANCO NACIONAL DE LÍNEAS CELULARES



Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona
Center of Regenerative Medicine in Barcelona

Anexo 2 Cariotipo [K]iPS4F-1

SOLICITUD DE DEPÓSITO DE LA LÍNEA CELULAR [K]iPS4F-1 EN EL BANCO NACIONAL DE LÍNEAS CELULARES



KiPS4F-1

Data d'entrada: 6/03/2009

ESTUDI CITOGENÈTIC

El resultat obtingut en l'estudi citogenètic fet a la mostra de **cèl·lules mare** rebuda amb aquest nom és:

- **Resultat citogenètic: 46,XY**

Comentari:

En l'estudi citogenètic realitzat mitjançant la tècnica de bandes G amb 150bjh no s'ha observat cap alteració cromosòmica. S'ha estudiat un total de 20 metafases procedents dels cultius cel·lulars de la mostra.

Observacions:

El resultat citogenètic no exclou la presència d'anomalies no detectables degut a limitacions pròpies de la tècnica, com poden ser: mosaics de baixa freqüència i alteracions estructurals de mida petita (microdeleccions i microduplicacions).
Els estudis citogenètics tenen una fiabilitat superior al 99%.


Barcelona, 9/03/2009


Dr. A. Serés Santamaría
Genetista clínic

CASANOVA, 155 ENTLO. A
08036 BARCELONA
TELÉFONO 93 419 56 56
FAX 93 419 61 61
e-mail: laboratori@prenatalgenetics.net
www.prenatalgenetics.net

Laboratorio sometido al control de calidad británico para laboratorios de genética (UK-NEQAS).

KiPS4F-1




| | |
|--------------|----------|
| Nom del cas: | 09cm0501 |
| imatge: | 002 |
| Pacient: | |
| Cariotip: | 46, XY |


Data: 09/03/2009

Anexo 3


Diferenciación *in vitro* [K]iPS4F-1



Diferenciación *in vitro* a mesodermo: Células positivas para α -actinina



Diferenciación *in vitro* a endodermo: Células positivas para α -fetoproteína




Diferenciación *in vitro* a ectodermo: Células positivas para GFAP y Tuj1




Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona
Center of Regenerative Medicine in Barcelona

Anexo 4


Diferenciación *in vivo* [K]iPS4F-1




Diferenciación *in vivo*: imagen general del teratoma



Diferenciación *in vivo* a endodermo. Tejido positivo para α -fetoproteína



Diferenciación *in vivo* a mesodermo. Tejido positivo para α -actinina.



Diferenciación *in vivo* a ectodermo. Tejido positivo para Tuj1.

SOLICITUD DE DEPÓSITO DE LA LÍNEA CELULAR [K]iPS4F-1 EN EL BANCO NACIONAL DE LÍNEAS CELULARES

Anexo 5

Estudio de la metilación de los promotores Oct4 y Nanog en [K]iPS4F-1



Estudio de la metilación de los promotores Oct4 y Nanog en [K]iPS4F-1